

Міністерство освіти і науки України  
Донецький національний технічний університет

Кафедра "Вища математика" ім. В.В. Пака

## **Збірник науково-методичних робіт**

Випуск 6

Донецьк -2009

УДК 5:371.214.114, 621.923, 517.95(09), 531.18, 915.77.54, 531.38, 517.9,  
517, 518, 531, 517.8, 539.5, 517.926.

Рекомендовано до друку Радою Донецького Національного технічного Університету  
Протокол № 5 від 19.06.2009 р.

**Збірник науково-методичних робіт.** - Вип. 6. - Донецьк: ДонНТУ, 2009. - 231 с.

В сборнике представлены результаты научно-методических исследований по вопросам совершенствования методики преподавания высшей математики во ВТУЗах и внедрения новых методов обучения.

Рассматриваются также различные направления использования математических методов к решению инженерных задач, а именно, задач механики твёрдого тела, физики магнитных явлений и др.

Издание рассчитано на преподавателей, аспирантов и широкий круг научных, инженерно-технических работников различных отраслей промышленности.

**Редакційна колегія:** проф. Улітін Г.М. - редактор, проф. Петренко О.Д., проф. Лесіна М.Ю, проф. Косолапов Ю.Ф., доц. Євсєєва О. Г., Локтіонов І.К. (ДонНТУ).

Адреса редакційної колегії: Україна, 83050, м. Донецьк, вул. Артема, 96, ДонНТУ, 3-й учбовий корпус, кафедра "Вища математика", тел. (062) 3010901.

© Донецький Національний технічний університет, 2009 р.

## Численные методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений – общий подход

*Локтионов И.К., Гусар Г.А.*

*Донецкий национальный технический университет*

*Рекуррентные формулы некоторых численных методов интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений получены с использованием квадратурных формул прямоугольников, трапеций и парабол.*

Известно, что одним из эффективных способов вывода рабочих формул методов Рунге-Кутты решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений основан на геометрических построениях [1]. Однако, более естественным, а поэтому, возможно, более удобным для восприятия представляется подход, основанный на применении квадратурных формул.

Методы Рунге-Кутты обладают рядом характерных свойств:

- 1) они не требуют вычисления производных от  $f(x, y)$ , а требуют только вычисления значений  $f(x, y)$ ;
- 2) согласуются с рядом Тейлора вплоть до членов порядка  $h^p$ , где степень  $p$  различна для различных методов и называется порядком метода;
- 3) значение  $y_{m+1}$  вычисляется по найденным значениям за некоторое число действий по одним и тем же формулам;
- 4) позволяют выполнять расчёты с переменным шагом;
- 5) все они (кроме метода Эйлера) имеют хорошую точность.

Недостатком всех методов является систематическое накопление ошибок – чем дальше значение  $x$  от начальной точки  $x_0$ , тем больше отклонение приближённого решения от точного.

Предлагаемый подход к изложению численных методов решения задачи Коши заключается в следующем.

Пусть требуется найти частное решение дифференциального уравнения (ДУ)

$$y' = f(x, y), \quad (1)$$

удовлетворяющее начальному условию  $y_0 = y(x_0)$  в точках  $x_{m+1} = x_m + m \cdot h$ ,  $m = \overline{0, n-1}$ ,  $h > 0$ . ДУ (1) может быть преобразовано к интегральному уравнению

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(x, y(x)) dx, \quad (2)$$

с помощью которого определяются значения искомой функции в точках  $x_m$  и  $x_{m+1}$

$$y(x_m) = y_m = y_0 + \int_{x_0}^{x_m} f(x, y(x)) dx, \quad (3)$$

$$y(x_{m+1}) = y_{m+1} = y_0 + \int_{x_0}^{x_{m+1}} f(x, y(x)) dx. \quad (4)$$

Вычитание из (4) (3) приводит к основному уравнению

$$y_{m+1} = y_m + \int_{x_m}^{x_{m+1}} f(x, y(x)) dx, \quad (5)$$

связывающему значения  $y_m$  и  $y_{m+1}$  в двух соседних точках.

Численные методы решения задачи Коши отличаются друг от друга способами приближённого вычисления интеграла в правой части соотношения (5).

Предположим, что точка  $(x_m, y_m)$  на интегральной кривой известна.

1) **Метод Эйлера** (метод ломаных). Если подынтегральную функцию  $f(x, y)$  в (5) заменить её значением в точке  $(x_m, y_m)$ , то интеграл будет равен

$$\int_{x_m}^{x_{m+1}} f(x, y) dx = f(x_m, y_m) \int_{x_m}^{x_{m+1}} dx = h \cdot f(x_m, y_m).$$

Такая замена равносильна применению формулы левых прямоугольников при вычислении определённого интеграла (точка  $x_m$  - левая граница отрезка  $[x_m; x_{m+1}]$ ). В результате из (5) получаем вычислительную схему Рунге-Кутты первого порядка – метод Эйлера, согласующийся с рядом Тейлора вплоть до членов  $\propto h$

$$y_{m+1}^{\text{Э}} = y_m + h \cdot f(x_m, y_m). \quad (6)$$

Погрешность метода на каждом шаге  $\propto h^2$ , однако глобальная погрешность, в силу систематического накопления ошибок на каждом шаге  $\propto h$ .

Рассмотренный метод можно усовершенствовать по крайней мере двумя способами, которые связаны с формулой трапеций и формулой средних прямоугольников.

2) **Метода Эйлера-Коши**. Одним из методов Рунге-Кутты второго порядка с коррекцией по средней производной является так называемый исправленный метод Эйлера, который в литературе встречается также под названием второго улучшенного метода Эйлера и метода трапеций.

К вычислительной схеме метода приводит интерполирование подынтегральной функции  $f(x, y)$  на отрезке  $[x_m; x_{m+1}]$  многочленом первой степени, т.е. представление её в виде

$$f(x, y) = f(x_m, y_m) + \frac{f(x_{m+1}, y_{m+1}^{\text{Э}}) - f(x_m, y_m)}{h} (x - x_m), \quad (7)$$

где значение  $y_{m+1}^{\text{Э}}$  вычисляется методом Эйлера (6).

Вычислив интеграл в правой части (5) с функцией (7) получим

$$y_{m+1}^{\text{Э.-К.}} = y_m + \frac{h}{2} \cdot (f(x_m, y_m) + f(x_{m+1}, y_{m+1}^{\text{Э}})), \quad (8)$$

где  $y_{m+1}^{\exists} = y_m + h \cdot f(x_m, y_m)$ .

Подчеркнём, что интерполяция многочленом (7) геометрически приводит к замене интеграла в правой части (5) площадью трапеции.

3) **Модифицированный метод Эйлера.** Несколько более точное значение  $y_{m+1}$  искомой функции в точке  $x_{m+1}$  может быть получено с помощью модифицированного метода Эйлера (метод Рунге-Кутты второго порядка с коррекцией в средней точке, первый улучшенный метод Эйлера, метод срединных точек).

В основе метода лежит интерполирование функции  $f(x, y)$  на отрезке  $[x_m; x_{m+1}]$  её значением в средней точке  $x_{m+1/2} = x_m + h/2$ ,

$y_{m+1/2} = y_m + \frac{h}{2} f(x_m, y_m)$ . Положив, как это делается в методе средних

прямоугольников, подынтегральную функцию в правой части равной её значению в средней точке отрезка  $[x_m; x_{m+1}]$

$$f(x, y) = f(x_{m+1/2}, y_{m+1/2}), \quad (9)$$

после интегрирования (5) приходим к следующей вычислительной схеме

$$y_{m+1}^{M.\exists} = y_m + h \cdot f\left(x_m + \frac{h}{2}, y_m + \frac{h}{2} f(x_m, y_m)\right). \quad (10)$$

Поскольку погрешность квадратурной формулы средних прямоугольников вдвое меньше погрешности формулы трапеций, то значение искомой функции  $y_{m+1}$ , вычисляемое по формуле (10) точнее, чем соответствующее значение, определяемое методом Эйлера-Коши (8).

Отметим, что метод Эйлера-Коши (8) и модифицированный метод Эйлера (10) согласуются с рядом Тейлора вплоть до членов  $\propto h^2$ .

4) Значения неизвестной функции  $y_{m+1}$  можно ещё более уточнить, если подынтегральную функцию  $f(x, y)$  представить интерполяционным многочленом Ньютона. Учитывая значения  $f(x, y)$  в точках  $(x_m, y_m)$ ,  $(x_{m+1/2}, y_{m+1/2})$ ,  $(x_{m+1}, y_{m+1})$ , т.е. на концах отрезка  $[x_m; x_{m+1}]$  и в его середине, получаем многочлен второй степени по  $x$ :

$$f(x, y) = f(x_m, y_m) + \frac{2\Delta f_m}{h}(x - x_m) + \frac{2\Delta^2 f_m}{h^2}(x - x_m)(x - x_{m+1/2}), \quad (11)$$

где  $\Delta f_m = f(x_{m+1/2}, y_{m+1/2}) - f(x_m, y_m) = f_{m+1/2} - f_m$ ,

$$\Delta f_{m+1} = f(x_{m+1}, y_{m+1}) - f(x_{m+1/2}, y_{m+1/2}) = f_{m+1} - f_{m+1/2},$$

$$\Delta^2 f_m = \Delta f_{m+1} - \Delta f_m = f_{m+1} - 2f_{m+1/2} + f_m.$$

Вычисление интеграла (5) с функцией (11) приводит к формуле

$$y_{m+1} = y_m + \Delta y_m = y_m + \frac{h}{6}(f_m + 4f_{m+1/2} + f_{m+1}), \quad (12)$$

которая носит название канонической формулы парабол (Симпсона). Она имеет более высокую точность по сравнению с квадратурными формулами трапеций и средних прямоугольников и позволяет построить несколько вычислительных схем для нахождения  $y_{m+1}$  по заданному  $y_m$ . Вычислительные схемы будут отличаться одна от другой способами определения значений  $f_{m+1/2}$  и  $f_m$ , входящих в формулу парабол. Общей отличительной от «традиционных» методов – метода Эйлера и его модификаций, чертой всех способов вычисления  $y_{m+1}$  должна быть более высокая точность.

Рассмотрим несколько возможных вариантов этих схем.

1. Наиболее простой представляется следующая: методом Эйлера устанавливаются значения  $y_{m+1/2}^{\text{Э.}} = y_m + \frac{h}{2}f(x_m, y_m)$ ,  $y_{m+1}^{\text{Э.}} = y_m + hf(x_m, y_m)$ , а после этого вычисляются значения функции  $f_{m+1/2} = f(x_{m+1/2}, y_{m+1/2}^{\text{Э.}})$ ,  $f_{m+1} = f(x_{m+1}, y_{m+1}^{\text{Э.}})$  и  $\Delta y_m = \frac{h}{6}(f_m + 4f_{m+1/2} + f_{m+1})$ .

2. Этот вариант отличается от предыдущего уменьшением шага

$$\text{вдвое } y_{m+1/2}^{\text{Э.}} = y_m + \frac{h}{2}f(x_m, y_m), \quad y_{m+1}^{\text{Э.}} = y_{m+1/2}^{\text{Э.}} + \frac{h}{2}f(x_{m+1/2}, y_{m+1/2}^{\text{Э.}}),$$

$$f_{m+1/2} = f(x_{m+1/2}, y_{m+1/2}^{\text{Э.}}), \quad f_{m+1} = f(x_{m+1}, y_{m+1}^{\text{Э.}}), \quad \Delta y_m = \frac{h}{6}(f_m + 4f_{m+1/2} + f_{m+1}).$$

3. Комбинация метода парабол и метода Эйлера-Коши

$$y_{m+1/2}^{\text{Э.}} = y_m + \frac{h}{2}f(x_m, y_m), \quad y_{m+1}^{\text{Э.}} = y_m + hf(x_m, y_m), \quad f_{m+1/2} = f(x_{m+1/2}, y_{m+1/2}^{\text{Э.}}).$$

$$y_{m+1}^{\text{Э.-К.}} = y_m + \frac{h}{2}(f(x_m, y_m) + f(x_{m+1}, y_{m+1}^{\text{Э.}})), \quad f_{m+1} = f(x_{m+1}, y_{m+1}^{\text{Э.-К.}}).$$

$$\Delta y_m = \frac{h}{6}(f_m + 4f_{m+1/2} + f_{m+1}).$$

4. Комбинация метода парабол и модифицированного метода Эйлера

$$y_{m+1/2}^{\text{Э.}} = y_m + \frac{h}{2}f(x_m, y_m), \quad f_{m+1/2} = f(x_{m+1/2}, y_{m+1/2}^{\text{Э.}}),$$

$$y_{m+1}^{M.\text{Э.}} = y_m + hf(x_{m+1/2}, y_{m+1/2}^{\text{Э.}}), \quad f_{m+1} = f(x_{m+1}, y_{m+1}^{M.\text{Э.}}),$$

$$\Delta y_m = \frac{h}{6}(f_m + 4f_{m+1/2} + f_{m+1}).$$

Точность в этом случае несколько выше, чем в случае 3.

5. Вычислительная схема имеет меньшую погрешность по сравнению с вариантами 1-4 и реализуется следующими рекуррентными формулами:

$$y_{m+1/2}^{\text{Э.}} = y_m + \frac{h}{2}f(x_m, y_m), \quad f_{m+1/2} = f(x_{m+1/2}, y_{m+1/2}^{\text{Э.}}),$$

$$y_{m+1/2}^* = y_m + \frac{h}{2}f(x_{m+1/2}, y_{m+1/2}^{\text{Э.}}), \quad f_{m+1/2}^* = f(x_{m+1/2}, y_{m+1/2}^*),$$

$$\overline{f_{m+1/2}} = \frac{1}{2}(f_{m+1/2} + f_{m+1/2}^*), \quad f_{m+1} = f(x_{m+1}, y_m + h\overline{f_{m+1/2}}),$$

$$\Delta y_m = \frac{h}{6}(f_m + 4\overline{f_{m+1/2}} + f_{m+1}).$$

6. Метод Рунге-Кутты четвёртого порядка, наиболее распространённый на практике, может быть получен из предыдущего заменой  $\overline{f_{m+1/2}}$  при вычислении

$$f_{m+1} \text{ на } f_{m+1/2}^*: \quad y_{m+1/2}^{\mathcal{E}} = y_m + \frac{h}{2}f(x_m, y_m), \quad f_{m+1/2} = f(x_{m+1/2}, y_{m+1/2}^{\mathcal{E}}),$$

$$y_{m+1/2}^* = y_m + \frac{h}{2}f(x_{m+1/2}, y_{m+1/2}^{\mathcal{E}}), \quad f_{m+1/2}^* = f(x_{m+1/2}, y_{m+1/2}^*),$$

$$\overline{f_{m+1/2}} = \frac{1}{2}(f_{m+1/2} + f_{m+1/2}^*), \quad f_{m+1} = f(x_{m+1}, y_m + h\overline{f_{m+1/2}}),$$

$$\Delta y_m = \frac{h}{6}(f_m + 4\overline{f_{m+1/2}} + f_{m+1}).$$

Для иллюстрации возможностей представленных вариантов рассмотрим решение задачи Коши для ДУ  $y' = 2y/x + x$ ,  $y(1) = 0$  с помощью каждого из них (очевидно, что эта задача допускает точное решение). Результаты численного решения задачи Коши представлены в двух таблицах. Сравнение результатов, полученных «традиционными» методами (таблица 1) с результатами комбинированных методов (таблица 2) позволяет сделать вывод, что совместное использование формулы парабол и «традиционных» методов приводит к более точным значениям искомой функции (варианты 1, 3, 4 в таблице 2).

Таблица 1.

| $x_m$ | $y_m^{\mathcal{E}}$ | $y_m^{\mathcal{E}-K}$ | $y_m^{M.\mathcal{E}}$ | $y_m^{P.-K}$ | Точное решение |
|-------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------|
| 1     | 0                   | 0                     | 0                     | 0            | 0              |
| 1,2   | 0,2                 | 0,253333              | 0,256364              | 0,26247      | 0,262543       |
| 1,4   | 0,506667            | 0,638095              | 0,645315              | 0,659336     | 0,659486       |
| 1,6   | 0,931429            | 1,166803              | 1,179315              | 1,202977     | 1,203209       |
| 1,8   | 1,484286            | 1,850265              | 1,869134              | 1,904107     | 1,904429       |
| 2,0   | 2,174127            | 2,697993              | 2,724253              | 2,772117     | 2,772589       |

Таблица 2.

| $x_m$ | $y_m^{\text{Э.}} \{1\}$ | $y_m^{\text{Э.-К.}} \{3\}$ | $y_m^{\text{М.Э.}} \{4\}$ | $y_m^{\text{К.Р.К.}} \{5\}$ | Точное решение |
|-------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1     | 0                       | 0                          | 0                         | 0                           | 0              |
| 1,2   | 0,255354                | 0,258316                   | 0,258485                  | 0,262185                    | 0,262543       |
| 1,4   | 0,642907                | 0,64981                    | 0,650187                  | 0,658715                    | 0,659486       |
| 1,6   | 1,175141                | 1,18692                    | 1,187541                  | 1,201972                    | 1,203209       |
| 1,8   | 1,862838                | 1,880399                   | 1,881299                  | 1,902671                    | 1,904429       |
| 2,0   | 2,715489                | 2,739718                   | 2,740928                  | 2,770257                    | 2,772589       |

### *Литература*

1. Численные методы анализа - Б.П. Демидович, И.А. Марон, Э.З. Шувалова. - М., 1962 г.



## СОДЕРЖАНИЕ

|  |    |
|--|----|
| <b>1. Улитин Г.М., Мироненко Л.П.</b> Геометрический подход к выводу канонических уравнений линий второго порядка.....   | 3  |
| <b>2. Алексеева И.В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Коновалова Н.Р., Федорова Л.Б.</b> «Элементы прогамованого навчання в дистанційному курсі «Математичний аналіз»..... | 8  |
| <b>3. Власенко К.В.</b> Метод тоново-фазичної мотивації в інтенсивних технологіях навчання вищої математики.....   | 14 |
| <b>4. Гурьева Н.А., Голубева О.В.</b> Аффинные связности на многообразии с почти двойной структурой.....   | 20 |
| <b>5. Ехилевский С.Г., Голубева О.В., Гурьева Н.А.</b> Вероятностная интерпретация решения уравнения диффузии.....   | 26 |
| <b>6. О. Г. Євсєєва.</b> Розробка тестових завдань з вищої математики на основі методів інженерії знань.....   | 30 |
| <b>7. В.В. Малашенко, Т.И. Малашенко</b> Моделирование динамического скольжения дислокаций в гидростатически сжатых материалах.....                                      | 40 |
| <b>8. Локтионов И.К., Гусар Г.А.</b> Численные методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений – общий подход.....   | 46 |
| <b>9. Руссиян С. А. Головаха Д. В.</b> Вероятностная модель несанкционированного срабатывания аппаратуры защитного отключения при коммутации ответвления сети шахты..... | 52 |
| <b>10. Косолапов Ю.Ф., Шейка Е.</b> О параллельном изложении функций одной и многих переменных.....  | 55 |
| <b>11. Петренко А.Д.</b> О программе курса высшей математики в техническом университете.....   | 63 |
| <b>12. Терехов С.В.</b> Синергетика и менеджмент.....  | 67 |
| <b>13. Евсєєва Е.Г., Прокопенко Н.А.</b> Разработка дистанционного курса «Математика для экономистов» на базе платформы MOODLE.....                                      | 74 |
| <b>14. Никулін О.В., Наконечна Т.В.</b> Моделювання і математичні моделі наук та навчальних дисциплін як синергетичних систем....  | 79 |
| <b>15. Мироненко Л.П.</b> Соглашение о суммировании в линейной алгебре.....  | 84 |

|   |     |
|---|-----|
| <b>16. Н.Д.Орлова , Е.Ю.Орлова.</b> Рейтинговый контроль учебного процесса по дисциплине «ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА» курсантов ОНМА.....  | 90  |
| <b>17. Ехилевская В. Г.</b> Информационные технологии в формировании преемственности обучения математике в средней и высшей школе.....  | 93  |
| <b>18. Лавріненко Н.М.</b> До питання формування змісту математичної підготовки студентів.....  | 99  |
| <b>19. Варущик Н.П.</b> Рівнева диференціація навчання математики в умовах профільної у фізико-математичних класах ліцею.....   | 103 |
| <b>20. Улицкая Н.Ю.</b> Проблемы составления заданий по теме «ПРЕДЕЛЫ».....   | 111 |
| <b>21. Мироненко Л.П., Прокопенко Н.А.</b> Интегральная форма теоремы Лагранжа и её применение к определенному интегралу.....   | 115 |
| <b>22. Варварецька Г.А., Клімова Т.І., Сапронова Т.М.</b> Необхідність актуалізації проблеми паралельного викладу теми «Диференціювання функції однієї та багатьох змінних» на практичних заняттях з вищої математики в ОНМА..... | 123 |
| <b>23. Щетініна О. К.</b> Математичні методи прогнозування.....   | 129 |
| <b>24. Гребьонкіна О.С.</b> Развитие творческого мышления в процессе навчання вищої математиці .....  | 137 |
| <b>25. Пелашенко А.В., Прокопенко Н.А.</b> Анализ чувствительности задач линейного программирования.....  | 140 |
| <b>26. Мироненко Л.П., Бабенко А.И.</b> Единственность разложения рациональной дроби на сумму простейших дробей.....  | 144 |
| <b>27. Шульга Н. В.</b> Задачі міжпредметного характеру як засіб реалізації міжпредметних зв'язків у навчанні математики студентів вищих навчальних закладів.....   | 149 |
| <b>28. Паниотов Ю.Н., Перетолчина Г.Б.</b> Некоторые примеры к теме: «СИСТЕМЫ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН».....   | 155 |
| <b>29. Азарова Н.В.</b> Применение численных методов к решению некоторых задач теории резания.....  | 161 |
| <b>30. Данилюк Г.И., Ковалев И.Н., Кононыхин Г.А.</b> Устойчивость равномерных вращений кинетического накопителя энергии в случае его несимметрии.....  | 165 |
| <b>31. М.Е. Лесина, Н.Ф. Гоголева.</b> Применение дифференциальной геометрии для построения аксоидов в естественном базисе.....   | 171 |

|   |     |
|---|-----|
| <b>32. Евсеєва Е. Г., Савин А. И.</b> Разработка системы задач, направленных на формирование предметных умений, на основе моделирования обучаемого.....                                   | 185 |
| <b>33. Ехилевский С.Г., Голубева О.В., Пяткин Д.В.</b> Метод моментов в моделировании динамической сорбционной активности.....  | 189 |
| <b>34. Кобець А.С., Дем'яненко А.Г., Ключник Д.В.</b> Сучасна вища інженерна освіта в Україні – деякі тенденції, проблеми та перспективи.....   | 196 |
| <b>35. Данилюк Г.І., Ковальов І.М., Кононихін Г.А.</b> Деякі апріорні оцінки обмежених узагальнених розв'язків нелінійних параболічних рівнянь.....                                       | 199 |
| <b>36. Буркіна Н.В., Ігнатова Л.Б., Николайчук Т.І.</b> Проектування змісту дистанційного навчання математики.....  | 207 |
| <b>37. Малєєв В.Б., Журба В.В., Журба В.Вас.</b> ТЗН як інструмент управління ємністю інформації в викладанні фундаментальних дисциплін в технічному виші .....                           | 215 |
| <b>38. Гончаров А.Н.</b> Метод Гаусса и обратная матрица.....   | 222 |
| <b>39. Астахов В.М., Буланов Г.С.</b> Комплект заданий графического характера, ориентированных на развитие у студентов понятия «ОПОРНОЕ РЕШЕНИЕ» в задаче линейного программирования..... | 223 |
| <b>40. Александрова О.В., Ковалев И.Н.</b> Моделирование симметричных серпантин.....  | 225 |
| <b>41. Косилова Е.Ф.</b> Некоторые актуальные аспекты математической подготовки будущих экономистов.....  | 225 |
| <b>42. Vladimir Kochergin</b> MAGNETO-OPTICAL EFFECTS IN METAL-DIELECTRIC NANOCOMPOSITES .....  | 227 |